

## 販売名:ハイゼリー-B

〔使用上の注意〕 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕滋養強壮、肉体疲労・栄養障害・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、虚弱体質〔用法・用量〕成人(15才以上)1回1瓶(100mL)を1日1回服用する。なお、15才未満は服用しないこと。●用法・用量を守ること。〔成分〕1瓶(100mL)中 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム300mg、ローヤルゼリー200mg、人参エキス90mg(ニンジン600mgに相当)、ゴオウ抽出液200mg(ゴオウ2mgに相当)、イカリ草エキス20mg(イカリソウ200mgに相当)、カルニチン塩化物50mg、ビタミンB<sub>1</sub>塩酸塩10mg、ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル3mg、ビタミンB<sub>6</sub>5mg、シアノコバラミン1 $\mu$ g、ニコチン酸アミド20mg、パントテン酸ナトリウム10mg、無水カフェイン50mg 添加物:エチルパラベン、ブチルパラベン、安息香酸Na、ポピドン、クエン酸、D-ソルビトール、白糖、カラメル、香



第2類医薬品

100mL

料、メントール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、グリセリン、トコフェロール、その他1成分(アルコール1.0mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

金属:キャップ、ガラス:瓶

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931



〔製造販売元〕東京都中央区日本橋小舟町10-11  
ゼリア新薬工業株式会社  
お客様相談室 ☎03-3661-2080

製造番号

使用期限  
[年/月]

ハイゼリーはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。J11N

